

Séance du 28 avril 1914.

PRÉSIDENCE DE M. CAULLERY, VICE-PRÉSIDENT.

MM. R. BLANCHARD, PETIT, aîné, PIC et ROBERT, s'excusent de ne pouvoir assister à la séance.

L' « Association des pays nationaux de France et des colonies » (siège social : 65, avenue de la Grande-Armée) adresse ses statuts et des bulletins d'adhésion.

MM. GERMAIN, JOUBIN et ROULE sont délégués pour représenter la Société au Congrès des pêches maritimes, qui se tiendra à Tunis le mois prochain.

M. Georges BOUVRAIN, licencié ès-sciences naturelles, demeurant 55 bis, rue Gazan, à Paris (XIV^e), est présenté par MM. HÉROUARD et ROBERT.

M. SEMICHON fait une communication sur le vitellus de l'œuf de Truite.

ANTHICIDES EXOTIQUES NOUVEAUX OU PEU CONNUS [Col.].

PAR

Maurice PIC.

Notoxus guyanensis n. sp.

Elongatus, convexus, subnitidus, nigro-piceus, antennis pedibusque testaceis, elytris nigro-piceis, testaceo maculatis.

Allongé, rétréci postérieurement, convexe, peu brillant, distinctement pubescent de gris soyeux, noir de poix avec les membres testacés, élytres ayant chacun, sur coloration plus ou moins foncée, des macules testacées suivantes : une humérale plus ou moins étendue, une postmédiane oblique, une suturale vers le sommet, les dernières parfois jointes ; prothorax globuleux, corne très nettement dentelée sur les bords ; élytres subacuminés au sommet. Long. 1,8 - 2 mm. Guyane française (coll. Pic).

Peut se placer près de *N. erimius* Champ., très distinct par les dentelures du prothorax et les dessins des élytres.

Notoxus abyssinicus n. sp.

Elongatus, subconvexus, nitidus, rufo-testaceus, elytris nigris, testaceo maculatis.

Allongé, peu convexe, brillant, éparsément pubescent, roux-testacé, élytres noirs, ornés chacun de 2 macules discales testacées, une antérieure allongée, une postmédiane oblique, en outre sommet roussâtre ; prothorax robuste, à ponctuation forte et rapprochée, corne large, distinctement dentelée sur les côtés ; élytres subacuminés au sommet. Long. 3 mm. Abyssinie (coll. Pic).

Diffère de *N. Pentheri* Pic, par la corne prothoracique différente et les élytres foncés, maculés de testacé.

Notoxus Schimperi n. sp.

Angustatus, subconvexus, nitidus, rufo-testaceus.

Troit, peu convexe, brillant, éparsément pubescent, entièrement roux-testacé ; prothorax globuleux, modérément ponctué, corne longue et étroite, peu crénelée sur les côtés ; élytres subtronqués au sommet. Long. 3 mm. Abyssinie (SCHIMPER, in Muséum de Paris et coll. Pic).

Parfois les élytres sont foncés avec une fascie antérieure rousse, c'est alors la var. *unifasciatus*, originaire de l'Afrique orientale.

Voisin de *N. nigricolor* Pic, coloration moins foncée et corne un peu plus étroite.

Notoxus ater n. sp.

Satis robustus, subconvexus, nitidus, niger, antennis ad basin, tibiis tarsisque testaceis.

Assez robuste, subconvexe, brillant, nettement, mais peu densément, pubescent de gris, noir, base des antennes, tibias et tarsi, parfois la base des cuisses, testacés ; prothorax médiocrement ponctué, globuleux, robuste, corne assez large, sans crenelures latérales ; élytres subtronqués au sommet. Long. 2,5-3 mm. Afrique Or. : Shirati (coll. Pic).

Diffère de *N. nigricolor* Pic par le prothorax plus robuste, les antennes plus foncées, etc.

NOTOXUS SECTATOR Qued.

D'après un co-type de la coll. VAN DE POLL (1), cette espèce est robuste, peu allongée, avec la corne du prothorax large, non

(1) Collection m'appartenant aujourd'hui.

crénelée latéralement, de coloration foncée avec les membres et sur les élytres une macule postérieure testacée.

Notoxus Raffrayi v. nov. *erythreus*.

Elongatus, nitidus, testaceus, elytris ad basin nigro maculatis et post medium nigro fasciatis. Long. 3 mm. Erythrée coll. PIC).

Distinct, à première vue, de *N. Raffrayi* Pic par ses dessus élytraux.

NOTOXUS PERUVIANUS PIC.

Cette espèce est très distincte par sa coloration entièrement testacée et sa pubescence grise nette. — J'en possède maintenant un exemplaire acquis avec la coll. CHEVROLAT.

Notoxus bisbimaculatus n. sp.

Satis elongatus, nitidus, niger, antennis ad basin, tibiis tarsisque testaceis, elytris luteo 4-maculatis.

Assez allongé, brillant, orné de longs poils épars, noir avec la base des antennes, les tibias et les tarses testacés, élytres noirs ornés chacun, sur les côtés, d'une macule allongée antérieure et d'une fascie transversale postérieure jaunes; prothorax globuleux, corne étroite, fortement crénelée sur les côtés; élytres tronqués au sommet. Long. 3 mm. Afrique occidentale (coll. PIC).

Voisin de *N. numidicus* Luc., corne plus étroite et macules des élytres différentes.

Formicomus Rouyeri n. sp.

Elongatus, viridescens, antennis pedibusque testaceis, femoribus anticis dentatis.

Allongé, verdâtre métallique, membres testacés, cuisses antérieures munies d'une dent assez fine et tibias un peu élargis vers le milieu; tête rétrécie en arrière; prothorax assez élargi en avant; élytres pas très larges et allongés. Long. 5 mm. Java (ROUYER *in* coll. PIC).

Peut se placer près de *F. robustipes* Pic, forme plus allongée, cuisses rousses, etc.

Formicomus rufopiceus v. nov. *subscutellaris*.

Rufo-testaceus, elytris satis, latis viridescens, ad basin breve rufo notatis. Long. 4 mm. Java (coll. PIC) (1).

(1) J'ai reçu, il y a quelque temps, cette forme en communication de M. von KREKICH-STRASSOLD.

Paraît différer de la var. *rufobasalis* Pic par les élytres un peu plus élargis, à peine teintés de roux à la base et vers l'écusson et aussi, probablement, par la ponctuation fine et écartée sur le disque du prothorax.

Anthicus malabarensis v. nov. *postrufescens*.

Elytris nigris, lateraliter ad basin late et postice ad suturam rufo notatis. Malabar (coll. Pic).

Distinct de la forme type par la coloration rousse plus étendue sur les élytres.

Anthicus malabarensis v. nov. *tachanensis*.

Elytris nigris, ad basin rufofasciatis. Indes (coll. Pic).

Distinct par la base des élytres obscurcie.

Anthicus separatithorax n. sp.

Nitidus, testaceus, oculis griseis; thorace lateraliter impresso.

Brillant, testacé avec les yeux gris, à ponctuation fine sur la tête, forte sur le prothorax et moyenne sur les élytres qui sont larges; tête subarquée postérieurement; prothorax un peu plus long que large, sinué sur les côtés, impressionné sur les flancs; élytres à faible dépression posthumérale. Long. 3 mm. Indes: Dardjiling (HARMAND, in coll. Muséum Paris et Pic).

Voisin de *A. piceus* Laf., en diffère nettement par la ponctuation du prothorax plus forte que celle de la tête.

Anthicus (Aulacoderus) obockianus n. sp.

Nigro-piceus, elytris ad et post medium late pallido maculatis. antennis pedibusque pro maiore parte testaceis.

Noir de poix avec les membres en partie testacés, les élytres foncés, ornés chacun de 2 macules pâles larges qui laissent un dessin cruciforme foncé sur le milieu de ces organes; tête arquée; prothorax court, à sillon basal interrompu au milieu. Long. 2,5 mm. Obock (coll. Pic).

Sans doute voisin de *A. lignichoïdes* Kolbe qui ne m'est connu que par la description.

Ouvrages offerts.

HÉBERT (L.). — Le Cancer, nouvelles lumières et solution d'un vieux problème (Lyon, 1912, in-8°).